

## RÉSUMÉ

La mesure de la qualité de vie apporte des éléments pertinents du fait de la chronicité des lymphoedèmes. Cette mesure permet au thérapeute d'adapter le traitement et de donner des conseils adaptés à chaque patient. La simple mesure de la périmétrie ne permet pas d'évaluer l'impact de la maladie sur le quotidien du patient. Sans cette mesure, le praticien ne prend pas en considération les retentissements physiques, sociaux et psychologiques.

Il existe un questionnaire de qualité de vie pour les patients porteurs d'un lymphoedème au membre supérieur, appelé L.M.S.27. Cependant, il n'en existe pas pour le membre inférieur. C'est pourquoi nous voulons proposer un score de qualité de vie pour les patients porteurs de lymphoedème au(x) membre(s) inférieur(s).

Notre étude s'est déroulée en plusieurs étapes : entretiens semi-structurés, proposition d'un pré-questionnaire, élimination des items les moins pertinents grâce à une série de questionnaires et analyse factorielle de ce dernier. Cette démarche a permis d'aboutir au questionnaire final. Vous pourrez découvrir la manière dont le score de qualité de vie se calcule, grâce à une formule relativement simple à appliquer, ainsi qu'un questionnaire spécifique, adapté au(x) lymphoedème(s) du (des) membre(s) inférieur(s).

**Mots clés :** Lymphoedème, membre inférieur, qualité de vie.