

RÉSUMÉ

Objectif : Evaluer le taux d'adressage à un pneumologue suite à un repérage positif de la B.P.C.O. réalisé par le masseur-kinésithérapeute via un questionnaire.

Méthode : Les patients fumeurs et anciens fumeurs constituaient la population cible dans deux services de réadaptation fonctionnelle. Un questionnaire de repérage de la B.P.C.O. leur été proposé durant leur rééducation. S'il était positif, le résultat était envoyé au médecin généraliste du patient. Le médecin recevait également un questionnaire dont le but était de connaître ses propositions pour son patient à la suite de ce repérage. 5 à 6 mois après le questionnaire de repérage, les patients ont été contacté par téléphone et ont répondu à un autre questionnaire, le but étant de savoir si des mesures complémentaires ont été prévues à la suite du repérage.

Résultats : 51 patients ont répondu au questionnaire de repérage : 18 questionnaires étaient positifs. 9 médecins sur 18 ont répondu au questionnaire leur étant destiné. Le sujet du repérage de la B.P.C.O. devait être abordé avec 6 patients. 3 patients devaient être adressés à un pneumologue, 2 devaient réaliser une mesure du souffle et consulter un pneumologue, et 1 patient devait réaliser une mesure du souffle. Le questionnaire téléphonique a révélé qu'aucun patient n'a consulté de pneumologue, un patient a réalisé une mesure du souffle et il a ensuite refusé une consultation en pneumologie. 1 patient a réalisé une radiographie pulmonaire. Dans la période suivant le repérage, 11,7% des participants à l'étude ont arrêté leur consommation de tabac, 17,6% des participants ont significativement réduit leur consommation de tabac.

Conclusion : Le taux d'adressage à un pneumologue est inférieur à celui espéré en théorie et inférieur à celui attendu d'après les réponses des médecins généralistes. Il est toutefois important que le kinésithérapeute reste impliqué dans le repérage de la B.P.C.O., puisque dans la période suivant le questionnaire de repérage, une baisse du tabagisme a été observée au sein de l'échantillon de l'étude.

Mots-clés : B.P.C.O., tabac, dépistage, questionnaire, kinésithérapie

Keywords: C.O.P.D., tobacco, screening, questionnaire, physiotherapy